



8	キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔	1コース:42日																																															
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
	キイトルーダ	400 mg/body	●																																														

9	キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔+インライタ	1コース:42日																																																	
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42							
	キイトルーダ	400 mg/body	●																																																
	インライタ	10 mg/day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

10	ジェブタナ	1コース:21日																					
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ジェブタナ	20~25 mg/m <sup>2</sup>	●																				

11	ドセタキセル(低用量)+エストラサイト	1コース:21日																					
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ドセタキセル	25 mg/m <sup>2</sup>		●							●												
	エストラサイト	4 Cap/day	●	●	●					●	●	●											

12	ドセタキセル(泌尿器)	1コース:21日																					
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	●																				

13	バベンチオ(10mg/kg)+インライタ	1コース:14日														
	抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	バベンチオ	10 mg/kg	●													
	インライタ	10 mg/day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

b