【泌尿器科】

2024年7月25日更新

1

GC		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール	1000 mg/㎡	●							●							●						
シスプラチン	70 mg/㎡		●																			

2

GC（CBDCA）		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール	1000 mg/㎡	●							●							●						
カルボプラチン	AUC 5		●																			

3

オプジーボ（240mg/body）		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ	240 mg/body	●													

4

オプジーボ（240mg/body）＋ヤーボイ（1mg/kg）		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オプジーボ	240 mg/body	●																				
ヤーボイ	1 mg/kg	●																				

5

オプジーボ（480mg/body） 4週間隔		1コース：28日																									
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ	480 mg/body	●																											

6

キイトルーダ（200mg/body）		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				

7

キイトルーダ(200mg/body)＋インライタ		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200 mg/body	●																				
インライタ	10 mg/day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

8

キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔		1コース：42日																																							
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	400 mg/body	●																																									

9

キイトルーダ(400mg/body)6週間間隔＋インライタ		1コース：42日																																								
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
キイトルーダ	400 mg/body	●																																								
インライタ	10 mg/day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

10

ジェブタナ		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェブタナ	20～25 mg/㎡	●																				

11

ドセタキセル（低用量）＋エストラサイト		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	25 mg/㎡		●							●												
エストラサイト	4 Cap/day	●	●	●					●	●	●											

b

12

ドセタキセル（泌尿器）		1コース：21日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75 mg/㎡	●																				

13

バベンチオ(10mg/kg)＋インライタ		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
バベンチオ	10 mg/kg	●													
インライタ	10 mg/day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

14

バベンチオ(10mg/kg)		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
バベンチオ	10 mg/kg	●													

15

オプジーボ(240mg/body)＋カボメティクス		1コース：14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ	240 mg/body	●													
カボメティクス	40mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

16

オプジーボ(480mg/body)4週間隔＋カボメティクス		1コース：28日																											
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ	240 mg/body	●																											
カボメティクス	40mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

17

ドセタキセル（75mg/㎡）＋ニュベクオ	1コース：21日

抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75 mg/㎡	●																				
エストラサイト	1200 mg/day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●